

DORIANA

Supplemento agli

ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA"

GENOVA

Vol. VI - N. 255

20 - III - 1985

GIUSEPPE PLATIA *

DESCRIZIONE DI UNA NUOVA SPECIE DI *ATHOUS* ESCHZ.
(COL. ELATERIDAE) DELL'ALBANIA

Tra gli Elateridi indeterminati della collezione Binaghi, conservata nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova, ho notato un esemplare di *Athous* Eschz. raccolto in Albania, che già Müller aveva etichettato « *Athous* spec. ? » e di cui Binaghi non aveva poi approfondito lo studio. Tale esemplare è risultato appartenere ad una specie inedita che viene qui descritta.

Porgo un sincero ringraziamento al Dr. R. Poggi, Conservatore del Museo di Genova, per avermi consentito l'esame degli Elateridi appartenenti alle collezioni del Museo e all'amico I. Gudenzi per aver eseguito i disegni che corredano il lavoro.

***Athous* (Orthathous) durazzo** n. sp.

Diagnosi: simile a *A. (O.) mesmini* Buysson del Caucaso, di cui recentemente ho potuto esaminare i tipi, si distingue per vari caratteri quali la maggior convessità del corpo, i lati del pronoto non sinuati posteriormente, gli angoli posteriori del pronoto non divergenti, il terzo articolo delle antenne molto più lungo del secondo.

Descrizione dell'Holotypus (fig. 1): maschio, lunghezza mm 8,85, larghezza max. mm 2,55; aspetto tozzo, colorazione interamente ferruginea scura con le zampe più chiare, parte inferiore tendente al neroastro; pubescenza lunga ai lati delle elitre, biancastra.

Indirizzo dell'Autore: Via Molino Vecchio, 21 - 47030 Gatteo (Forlì)


SMITHSONIAN

APR 15 1986

LIBRARIES

Capo più stretto della parte anteriore del pronoto con punteggiatura forte ed ombelicata; fronte impressa con carena clipeo-frontale ispessita, regolarmente arcuata, nel centro attenuata fino al livello del clipeo, ma nettamente distinta.

Occhi piccoli, leggermente convessi (indice oculare 65,1). Antenne superanti gli angoli posteriori del pronoto di due articoli; II antenno-mero 1,28 volte più lungo che largo, III 1,8 volte più lungo del II; II e III insieme 1,3 volte più lunghi del IV che è 1,5 volte più lungo che largo; V-X della lunghezza del IV, XI più lungo, cilindrico ed arrotondato all'apice.



Figg.: 1 - *Athous* (*Orthathous*) *durazzoii* n. sp., habitus Holotypus ♂. 2 Id., edeago in visione dorsale.

Pronoto molto convesso, 1,16 volte più lungo che largo, maggiore larghezza alla metà; lati leggermente arcuati, avanti gli angoli posteriori quasi rettilinei; angoli anteriori piccoli, poco sporgenti; angoli posteriori corti non divergenti; punteggiatura forte, uniforme ed ombelicata con punti fra loro tangenti soprattutto ai lati.

Elitre corte, 2,3 volte più lunghe del pronoto e 2,25 volte più lunghe che larghe; strie fortemente punteggiate, alla base molto incavate; interstrie convesse, trasversalmente rugose; scutello più piccolo dello spazio interelitrare, quadrangolare, poco convesso con accenno di carena al centro.

Zampe posteriori con il primo articolo dei tarsi della lunghezza dei due seguenti presi assieme; secondo e terzo di lunghezza decrescente; quarto molto più piccolo del precedente; inferiormente gli articoli sono muniti di una corta suola di setole.

Edeago (fig. 2) con lobo mediano appena più lungo dei parameri, fortemente ristretto all'apice; parameri acutamente dentati all'apice e lateralmente fortemente sinuati.

Femmina sconosciuta.

Derivatio nominis: dalla città di Durazzo dove la specie è stata rinvenuta.

Materiale esaminato: Holotypus ♂: Albania, Durazzo, 4.V.1917, con cartellino autografo di determinazione di J. Müller (« *Athous* sp.? »), conservato in coll. Binaghi presso il Museo di Storia Naturale di Genova.

BIBLIOGRAFIA

- BUYSSON H. DU, 1900 - Description d'une espèce et d'une variété nouvelles d'Elatérides du Caucase (Col.) - *Bull. Soc. Ent. Fr.*, **70**: 231-232.
- MÜLLER J., 1912 - Revision der *Athous*-Arten der Ostadriatischen Provinzen (Küstenland, kroat. Litorale, Dalmatien) - *Boll. Soc. Adriatica Sc. nat. Trieste*, **26** (2): 97-143.
- REITTER E., 1905 - Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren 56 Heft Elateridae, Elaterini, subtribus: Athouina, aus der palaearctischen Fauna - *Verh. Naturf. Ver. Brünn.*, **43**: 3-122.
- SCHENKLING S., 1927 - Coleopterorum catalogus, auspiciis et auxilio W. Junk - Elateridae II, pars 88: 264-636.

RIASSUNTO

Viene descritta una nuova specie di *Athous* dell'Albania.

La nuova specie è vicina ad *A. mesmini* Buysson del Caucaso dalla quale si distingue essenzialmente per il corpo più convesso, per gli angoli posteriori del pronoto non divergenti, per il terzo articolo delle antenne molto più lungo del secondo.

ABSTRACT

A new species of *Athous* Eschz. from Albania.

Athous (*Orthathous*) *durazzo* n. sp. is described from Durazzo (Albania); the new taxon is allied to *A. mesmini* Buyss. from Caucasus, but it is separated by the body more convex, by the hind angles of pronotum not diverging, the third article of antennae very longer as to second.
